



TMR стабілізація



Підігрівання раціонів молочної худоби зменшує споживання корму, знижує рівень поживних речовин і підвищує ризик захворювань (мастит, хвороби копит, проблеми з фертильністю, післяпологова поведінка, метаболічні розлади...).

При температурі приблизно вище 20 °C та високій вологості повітря кисень, який потрапляє в кормовий раціон шляхом змішування, може призвести до вибухоподібного збільшення природного запасу мікроорганізмів, особливо дріжджів.

Розпад вуглеводів призводить до нагрівання кормової суміші. Раціони з крохмалистими та багатими на цукор силосами, додаванням меляси або води становлять особливий ризик.

Про перегрів говорять тоді, коли температура кормової суміші на 2 °C вища за температуру повітря! Як правило, кожне підвищення температури на 10 °C означає щоденну втрату енергії в зоні нагрівання приблизно 0,1 МДж NEL/кг сухої речовини.

Заходи гігієни годівлі, від силосної ями до кормового столу

- ✓ Відкривайте лише стільки, скільки потрібно, закривайте краї якомога щільніше
- ✓ Створюйте плоскі поверхні зрізу
- ✓ Забезпечуйте достатню кількість корму в силосах, щонайменше 2 метри на тиждень
- ✓ Обробляйте поверхню зрізу рідиною LIKRACID (100 - 500 г/м²)
- ✓ Захищайте від потрапляння вологи
- ✓ Видаляйте залишки силосу
- ✓ Контролюйте температуру силосу, за допомогою термометра
- ✓ Вичищайте причіп кормозмішувача від залишків
- ✓ Очищайте годівницю один раз на день
- ✓ Не завантажуйте силос на наступний день
- ✓ Перевіряйте розданий раціон, не згодовуйте підігрітий корм
- ✓ Змішуйте та згодовуйте в прохолодніші години
- ✓ Додавайте LIKRA TMR-Stabil, який запобігає або уповільнює нагрівання кормових сумішей

**INFO**

Якщо не вдається досягти достатньої якості корму, завжди слід використовувати силосуючі засоби з подвійною дією (покращення аеробної стійкості, довговічності під впливом повітря; напр.: Likrasil bzw. Sizuba) завжди слід використовувати під час закладання силосу.



LIKRA TMR-Stabil додається для зменшення нагріву корму на кормовому столі

Загалом, органічні кислоти та їхні солі використовуються для пригнічення росту бактерій, плісняви та дріжджів. Мета полягає в тому, щоб пригнічувати ріст мікроорганізмів на початковій стадії та забезпечити стабільність початкової якості корму.



Використання кислот не підходить для того, щоб повернути якість корму, який вже був сильно забруднений бактеріями, до початково свіжого стану! Дія кислот базується на великій кількості індивідуальних впливів, але перш за все на зниження рН та порушенні метаболізму мікробів. Зміна рівня рН позбавляє мікроби основи для розвитку.

LIKRA TMR-Stabil це комбінація вискоєфективних консервуючих кислот у формі порошку.

Суміш сорбату калію, формиату натрію та пропіонату кальцію ефективно запобігає утворенню плісняви та росту дріжджів у змішаних раціонах.

Вигоди від використання:

- ✓ Зменшення зігрівання в раціоні TMR
- ✓ Зменшення втрат енергії та поживних речовин
- ✓ Більш гнучка подача раціонів
- ✓ Швидке та гнучке формування раціонів
- ✓ Зручність та простота у використанні, не піддаються корозії!

Рекомендоване застосування **LIKRA TMR-Stabil**

Змішані корми:

0,2 % – 2 кг/т при вимішуванні комбікорму та до свіжо-змішаної маси



ПОРАДА

При використанні власних концентратних сумішей, **LIKRA TMR-Stabil** можуть бути змішані в процесі подрібнення. Таким чином, активність мікроорганізмів у концентрованому кормі також знижується.